

التطعيمات للأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى



توصيات لحماية مرضى الجهاز التنفسي لخريف 2025

تهدف اللقاحات إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض خطيرة تؤدي إلى دخول المستشفى وربما الوفاة. الأشخاص المصابون بأمراض الكلى معرضون للخطر بشكل خاص. ملاحظة: تتوفر معظم اللقاحات في الصيدليات المحلية أو مقدمي الرعاية الأولية. كما تقدم منظمات غسيل الكلى العديد من اللقاحات المذكورة أدناه.

1

كوفيد-19

يوصى به سنوياً في الخريف.

2



الانفلونزا (لقاح بجرعة عالية)

يوصى بإعطائه سنوياً في فصل الخريف. استشر طبيبك لمعرفة ما إذا كان يجب عليك تلقي جرعة عالية من اللقاح.

3

الالتهاب الرئوي بالمكورات الرئوية

يوصى بإعطاء جرعة واحدة أو جرعتين اعتماداً على تاريخ التطعيم. يجب أن يتلقى جميع مرضى غسيل الكلى البالغين سلسلة كاملة من اللقاح.

4

الفيروس المخلوي التنفسي - RSV (البالغون من العمر 60 عاماً أو أكبر)

متى: الجرعة الأولية في أواخر الصيف/أوائل الخريف

لقاحات هامة أخرى:



التهاب الكبد

متى: سلسلة الجرعات الأولية المكونة من 3 أو 4 جرعات، مع تحديد العيارات السنوية

لقاح القوباء المنطقية (50 سنة وما فوق)

متى: جرعتين، بفاصل 2-6 أشهر

* غالباً ما يتم إعطاء لقاحات الأنفلونزا والتهاب الكبد B في منشأة غسيل الكلى

إذا تلقي مريض لقاحات كوفيد
والإنفلونزا، فهل هذا يعني أنه لن يصاب
بهذه الأمراض؟

إن تلقي لقاحات كوفيد والإنفلونزا لا يضمن عدم إصابة المريض بالفيروس. ومع ذلك، فإن تلقي التطعيمات يقلل من خطر الإصابة بمرض خطير. وقد ثبت أن خطر دخول المستشفى والوفاة ينخفض مع التطعيم.

لماذا يحتاج الأشخاص الذين يخضعون
لغسيل الكلى إلى لقاح المكورات
الرئوية؟

يمكن أن تسبب البكتيريا المكورات الرئوية مرضاً شديداً يؤدي إلى الالتهاب الرئوي، وإذا دخلت إلى مجرى الدم، فقد تؤدي إلى تعفن الدم. يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض الكلى إلى سلسلة الأولية وقد يحتاجون إلى جرعة معززة إضافية بعد 5 سنوات.

لماذا يحتاج الأشخاص الذين يخضعون
لغسيل الكلى إلى لقاح الفيروس المخلوي
التنفسي؟

هناك أدلة وبائية على أن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و74 عاماً والذين يعانون من مرض الكلى المزمن المتقدم (المرحلة 4-5، الاعتماد على غسيل الكلى أو غيره من علاجات استبدال الكلى) معرضون لخطر متزايد للإصابة بفيروس المخلوي التنفسي الشديد.

ملاحظة هامة

جب على المرضى الذين أصيبوا بحساسية مفرطة شديدة لجرعة أو مكون سابق، والمرضى الذين لديهم تاريخ من متلازمة غيلان باريه، استشارة طبيبهم قبل تلقي اللقاحات.



البريد الإلكتروني: epc@asn-
online.org
epc.asn-online.org