

VACUNAS PARA PERSONAS EN DIÁLISIS



RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PARA EL OTOÑO DE 2025

Las vacunas están destinadas a disminuir el riesgo de enfermedad grave que resulta en hospitalización y posiblemente la muerte. Las personas con enfermedades renales están especialmente en riesgo. Nota: La mayoría de las vacunas están disponibles en una farmacia local o proveedor de atención primaria. Las organizaciones de diálisis también proporcionan muchas de las vacunas siguientes.

1 COVID-19

Recomendado anualmente en el otoño.

2 INFLUENZA (VACUNA EN DOSIS ALTA) *

Recomendado anualmente en el otoño.
Consulte con su médico para saber si debe recibir la vacuna de dosis alta.

3 NEUMONÍA NEUMOCÓCICA

Se recomiendan una o dos dosis según el historial de vacunación. Todos los pacientes adultos en diálisis deben recibir una serie completa.

4 VIRUS RESPIRATORIO SINCITAL (VRS) (60 AÑOS Y MÁS)

Cuándo: dosis inicial a finales del verano/principios del otoño.

OTRAS VACUNAS IMPORTANTES:

HEPATITIS B *

Cuándo: serie inicial de 3 o 4 dosis, con títulos anuales

VACUNA CONTRA EL HERPES ZÓSTER (A PARTIR DE LOS 50 AÑOS)

Cuándo: dos dosis, con un intervalo de 2 a 6 meses

SI MI PACIENTE RECIBE LAS VACUNAS CONTRA EL COVID Y LA GRIPE, ¿SIGNIFICA ESO QUE NO SE ENFERMARÁN CON ESAS ENFERMEDADES?

Recibir las vacunas contra el COVID y la gripe no garantiza que los pacientes no se enfermen a causa del virus. Sin embargo, recibir las vacunas reduce el riesgo de enfermarse gravemente. Se ha demostrado que el riesgo de hospitalización y muerte disminuye con la vacunación.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS EN DIÁLISIS NECESITAN LA VACUNA ANTINEUMOCÓCICA?

Las bacterias neumocócicas pueden causar enfermedad grave que resulta en neumonía y, si entra en el torrente sanguíneo, sepsis.

Las personas con enfermedad renal necesitan la serie inicial y pueden necesitar una dosis de refuerzo adicional en 5 años.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS EN DIÁLISIS NECESITAN LA VACUNA CONTRA EL VRS?

Existe evidencia epidemiológica de que los adultos de 60 a 74 años con enfermedad renal crónica avanzada (estadio 4-5, dependencia de hemodiálisis u otra terapia de reemplazo renal) tienen mayor riesgo de presentar VRS grave.

NOTA IMPORTANTE

Los pacientes que hayan tenido anafilaxia grave a una dosis o componente anterior y los pacientes con antecedentes de síndrome de Guillain-Barré deben consultar a su médico antes de recibir las vacunas.

 epc@asn-online.org
 epc.asn-online.org

• *Las vacunas contra la influenza y la hepatitis B a menudo se administran en el centro de diálisis.