

VAKSINASI UNTUK ORANG YANG MENJALANI DIALISIS



REKOMENDASI PERLINDUNGAN PENYAKIT PERNAPASAN UNTUK MUSIM GUGUR 2025

Vaksin ditujukan untuk mengurangi risiko penyakit parah yang mengakibatkan rawat inap dan kemungkinan kematian. Orang dengan penyakit ginjal sangat berisiko. Catatan: Sebagian besar vaksin tersedia di apotek lokal atau penyedia layanan kesehatan primer. Organisasi dialisis juga menyediakan banyak vaksin di bawah ini.

1 COVID 19

Direkomendasikan setiap tahun di musim gugur.

2 INFLUENZA (VAKSIN DOSIS TINGGI) *

Direkomendasikan setiap tahun di musim gugur. Konsultasikan dengan dokter Anda untuk mengetahui apakah Anda harus menerima vaksin dosis tinggi.

3 PNEUMONIA PNEUMOKOKUS

Satu atau dua dosis dianjurkan, tergantung pada riwayat vaksin. Semua pasien dialisis dewasa harus menerima rangkaian lengkap.

4 VIRUS SINSIAL PERNAPASAN - RSV (USIA 60 TAHUN KE ATAS)

Kapan: dosis awal akhir musim panas/awal musim gugur

VAKSIN PENTING LAINNYA:

PENYAKIT HEPATITIS B *

Kapan: seri dosis awal 3 atau 4, dengan titer tahunan

VAKSIN HERPES ZOSTER (USIA 50 TAHUN KE ATAS)

Kapan: dua dosis, dengan jarak 2-6 bulan

**Vaksin untuk influenza dan hepatitis B sering diberikan di fasilitas dialisis*

JIKA PASIEN SAYA MENERIMA VAKSIN COVID DAN FLU, APAKAH ITU BERARTI MEREKA TIDAK AKAN TERSERANG PENYAKIT TERSEBUT?

Menerima vaksin COVID dan FLU tidak menjamin pasien tidak akan sakit akibat virus tersebut. Akan tetapi, menerima vaksinasi menurunkan risiko sakit parah. Risiko rawat inap dan kematian terbukti menurun dengan vaksinasi.

MENGAPA ORANG YANG MENJALANI DIALISIS MEMERLUKAN VAKSIN PNEUMOKOKUS?

Bakteri pneumokokus dapat menyebabkan penyakit parah yang mengakibatkan pneumonia, dan, jika masuk ke aliran darah, sepsis. Orang dengan penyakit ginjal memerlukan rangkaian awal dan mungkin memerlukan dosis penguat tambahan dalam 5 tahun.

MENGAPA ORANG YANG MENJALANI DIALISIS MEMERLUKAN VAKSIN RSV?

Terdapat bukti epidemiologis bahwa orang dewasa berusia 60-74 tahun dengan penyakit ginjal kronis stadium lanjut (stadium 4-5, ketergantungan pada hemodialisis atau terapi penggantian ginjal lainnya) berisiko lebih tinggi terkena RSV parah.

CATATAN PENTING

Pasien yang pernah mengalami anafilaksis berat terhadap dosis atau komponen sebelumnya, dan pasien dengan riwayat sindrom Guillain-Barre, harus berkonsultasi dengan dokter mereka sebelum menerima vaksin.

alamat email: epc@asn-online.org
epc.asn-online.org

